



Procedimiento de **detección precoz de pacientes con infección activa** por **SARS-CoV-2** en la **Farmacia Comunitaria**

Recomendaciones sanitarias para casos sospechosos, casos confirmados y contactos estrechos

1. Si es un **caso sospechoso**:



- Se deberá **poner en cuarentena** el paciente y también sus contactos estrechos. Si el resultado de la PCR del caso es negativa, se finalizará la cuarentena para todos ellos.

2. Si es un **caso confirmado**:



- Se deberá proceder al **aislamiento en su vivienda** para evitar contactos con la unidad familiar. Este deberá permanecer en su domicilio en una habitación individual, restringiendo al mínimo las salidas de la habitación que siempre se realizarán con mascarilla quirúrgica.



- En el caso de **no poder realizar el aislamiento** en condiciones óptimas, la cuarentena de la unidad familiar se prolongará 14 días desde el final del aislamiento del caso. En el caso de que **existan instalaciones de la comunidad** preparadas para el aislamiento, se recomienda la utilización de estas.



- Se deberá **lavar las manos frecuentemente** con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas especialmente después de toser, estornudar y tocar pañuelos u otras superficies potencialmente contaminadas. Estas medidas serán extensivas a la unidad familiar.



- Se deberá **tomar y anotar la temperatura** dos veces al día debiéndolo comunicar al responsable de su seguimiento.



- Deberá **estar localizable** a lo largo del periodo de seguimiento.



- **No deberá salir de su domicilio** salvo por causa justificada (acudir al centro de salud, hospital...) y con las medidas adecuadas de protección.

3. Si es un caso confirmado, **los contactos estrechos**:



- Deberán permanecer **en cuarentena** durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso confirmado.



- Deberán **evitar la toma de antitérmicos** durante el periodo de vigilancia para evitar enmascarar y retrasar la detección de la fiebre, a no ser que exista una prescripción médica.



- Si aparecen **síntomas compatibles** con COVID-19, deberán contactar con el responsable de su seguimiento indicando que se trata de un contacto estrecho de un caso de coronavirus. A partir de este momento, el contacto será considerado como caso sospechoso.